



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com

EC REP
BISICO France
208, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
33-4-90-42-92-92

IN-201R5
Rev. 5/20

Caution: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed Dentist.

INSTRUCTIONS FOR USE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

</div

nl	TheraCal PT®	Pulpotomiebehandeling met dubbel uitgehard harsgemoedificeerde calciumsilicicum
-----------	---------------------	--

ALGEMENE INFORMATIE
TheraCal PT is een biocompatibel dubbel uitgehard harsgemoedificeerde calciumsilicicum dat wordt gebruikt voor het behandelen van blootliggende dentine. De preclasse plasting van TheraCal PT maakt het gebruik eenvoudiger in de praktijk dan de traditionele methode. De dubbele uitharding maakt onmiddellijke plasticatie van het restauratierematerial mogelijk. De gebruikte formuleringen zijn gericht op het herstellen van de anatomische vorm en het herdenken, samtidig dat de opperhelfder ender plassing kan worden. De plasticatie kan worden gemaakte bijna vanwege de thermische eigenschappen.

Beoogde gebruiker: Gediplomeerde tandarts.

Primäre indicatie voor gebruik:

1. Pulpotomi

Secundaire indicatie voor gebruik:

2. Blougistide pulpa (direct pulp-afdekking)

3. Beschermende bedekking (indirect pulp-afdekking) en basis voor gebruik onder ulteropende substraten

Waarschuwingen:

• TheraCal PT bevat polymeriseerbare methacrylatmonomeren.

Uitgangs langheid of gelaagdheid contact met huid, ogen of mond kan leiden tot irritatie en mogelijke comedebeschaadiging.

Huidbeschadiging kan leiden tot allergische reacties (allergische contactkassen) kunnen ontstaan die zijn aanvoer gevoelige personen. Niet voor everyone inzake.

• TheraCal PT wordt niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met een ernstige allergische reactie op methacrylaatharissen in de anamnese.

Let op:

Kruisbeschutting:

• Dit product kan antikarikaal bevruchten de bestemd zijn voor eenmalig gebruik.

Voor gebruik van beschermende laagjes t.p.s. af.

• Niet reinigen desinfecteren of

• Het werk procesen om een vrije in handel verkrijgbare hygiënische beschermende bedekking te gebruiken om bescherming van sculpten tijdens de behandeling te voorkomen. Als de sculpten vertrongen gaan, kan dat weg. Niet reinigen of desinfecteren.

Voorzorgsmaatregelen:

• Het slagen van pulpavakceringsprocedures kan worden behaald door verontreiniging van het preparaat. Het gebruik van een rubberdam of adequate isolatie wordt aanbevolen.

• Pijn of ontsteking van de patiënt heeft gevold voor de gebruikte techniek.

• Pulpabiding moet onder controle worden gevoerd aan het aanbrengen van TheraCal PT. Als een bloeding niet onder controle kan worden gebracht, moet het inzien van een endodontische behandeling worden overwogen in plaats van het gebruik van directe pulpavakceringsprocedures. Het gebruik van rubberdam of adequate isolatie wordt aanbevolen.

• TheraCal PT is een product dat uitgebreid materiaal. Ga onmiddellijk verder wanneer het materiaal is aangegeven.

• Om polymerisatie of verslapping te voorkomen, moet de menging van de dubbele spuit op de plaats worden geladen tot de volgende toepassing.

• Bij intracraal gebruik moet de menging voorafgaand aan opslagen worden afgemengd met desinfectiemiddel.

• Procedere om avitaleerde pulpa (of exemplel formokresol) kan forhinderen dat de pulpa gebruikt kan worden.

• Als de pulpa beschermende laagjes worden gebruikt, kan er verkleuring optreden. Als deze samen worden gebruikt, moet er tussenliggend of met fysiologisch zwart gespoten.

• Ingebruik waarde de pulpa gedefendeerd rukt (bijvoorbeeld met formokresol) kunnen secundaire bruyeringsvorm mogelijk maken.

• Zie het etiket van de antropologische componenten voor de specifieke gebruiksaanwijzingen.

• Veiligheidsinformatie is op verzoek verkrijgbaar.

• Veiligheidsinformatie is verkrijgbaar op www.Bisco.com.

• Gebruiksaanwijzing op verzoek verkrijgbaar.

• Gebruiksaanwijzing verkrijgbaar op www.bisco.com.

Tekhnische informatie

Verwerkingsduur: 45 seconden bij 35 °C

Uithardingsduur: Maximaal 5 minuten bij 35 °C

Verwerkingsduur en uithardingsduur verschillen afhankelijk van de opslagomstandigheden (temperatuur, vochtigheid, enz.).

GEURSAANWIJZING

Geurvermindering: TheraCal PT

1) Neem de dubbele spuit of de mengspuit.

2) Doe een kleine hoeveelheid materiaal op een mengplaatje om eventuele leemtes in beide cilinders van de dubbele spuit te voorkomen.

3) Bevestig een mengpot op de dubbele spuit door de nok van de uitstroom met elkaar uit te lijmen. Draai vervolgens het vergrendelmechanisme rechtom.

4) Doe de dubbele spuit in een ander oppervlak voor voorbereiding.

5) Maak TheraCal PT rechtstreeks in de pulkapamer en zorg voor goede aanpassing aan de caviteiten en -randen.

6) Houd de TheraCal PT 10 seconden lang met licht.

7) Breng deeltjes gewenste adhesief basis en/of restauratie aan volgens de aanwijzingen van de fabrikant voor restauratie.

Blootliggende pulpa (directe pulpa-afdekking)

1) Verwijder onder rubberdamdeksel de geïnfecteerde dentine met een rond borstel en een handexcavator.

2) Verkrijg toegang tot de pulkapamer en verwijder de geïnfecteerde kroonpulpa met gebruikmaking van steriele borstels of instrumenten.

3) Blootliggen de pulpa moet u eerst herstellen berekend voor het gebruik van TheraCal PT.

4) Doe een matras rond de pulpa die eerst opgespoten is en afgeweven.

5) Maak TheraCal PT rechtstreeks in de pulkapamer en zorg voor goede aanpassing aan de caviteiten en -randen.

6) Houd de TheraCal PT 10 seconden lang met licht.

7) Breng deeltjes gewenste adhesief basis en/of restauratie aan volgens de aanwijzingen van de fabrikant voor restauratie.

Pulpavakcering (directe pulpa-afdekking)

1) Houd de pulpa en de pulkapamer voorzichtig met een steriele katoenen spet en de blougistide pulpa op de blougistide spelt.

2) Bereik de pulkapamer en verwijder de geïnfecteerde pulpa met een steriele katoenen spet.

3) Blootliggen de pulpa moet u eerst herstellen berekend voor het gebruik van TheraCal PT.

4) Doe een matras rond de pulpa die eerst opgespoten is en afgeweven.

5) Maak TheraCal PT rechtstreeks in de pulkapamer en zorg voor goede aanpassing aan de caviteiten en -randen.

6) Houd de TheraCal PT 10 seconden lang met licht.

7) Breng deeltjes gewenste adhesief basis en/of restauratie aan volgens de aanwijzingen van de fabrikant voor restauratie.

Oppervlakverzorging: Oppervlakken bewerken met rubberdam en een aantal verschillende instrumenten.

1) Bereik de pulkapamer voorzichtig met een steriele katoenen spet.

2) Bereik de pulkapamer en verwijder de geïnfecteerde pulpa met een steriele katoenen spet.

3) Blootliggen de pulpa moet u eerst herstellen berekend voor het gebruik van TheraCal PT.

4) Doe een matras rond de pulpa die eerst opgespoten is en afgeweven.

5) Maak TheraCal PT rechtstreeks in de pulkapamer en zorg voor goede aanpassing aan de caviteiten en -randen.

6) Houd de TheraCal PT 10 seconden lang met licht.

7) Breng deeltjes gewenste adhesief basis en/of restauratie aan volgens de aanwijzingen van de fabrikant voor restauratie.

HIGIËNE: Het aanbrengen à brûle varig ligengelijk hygiënische beschermende bedekking voor aanbrenging van TheraCal PT.

Beschermende bedekking en basis voor gebruik onder ulteropeende substraten:

1) Vóór onder rubberdamdeksel een conventionele cavitypreparesseert.

2) Bereik de pulkapamer en verwijder de geïnfecteerde pulkapamer.

3) Blootliggen de pulpa moet u eerst herstellen berekend voor het gebruik van TheraCal PT.

4) Bereik de pulkapamer voorzichtig met een steriele katoenen spet.

5) Blootliggen de pulpa moet u eerst herstellen berekend voor het gebruik van TheraCal PT.

6) Doe een matras rond de pulpa die eerst opgespoten is en afgeweven.

7) Maak TheraCal PT rechtstreeks in de pulkapamer en zorg voor goede aanpassing aan de caviteiten en -randen.

8) Houd de TheraCal PT 10 seconden lang met licht.

9) Breng deeltjes gewenste adhesief basis en/of restauratie aan volgens de aanwijzingen van de fabrikant voor restauratie.

GARANTIE: BISCO, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid voor de levering van producten indien ze defect blijken te zijn. BISCO, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van producten zoals beschreven. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor gebruik de geschiktheid van het product voor de toepassing doel te stellen. De gebruiker aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheid in verband daarmee.

*TheraCal PT is een gedeponeerd handelsmerk van BISCO, Inc.

Kennisgeving: Meld elk ernstig incident aan BISCO en aan de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat waar de gebruiker en/of patient gevestigd is.

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Auto-Mix-naaldspipet (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Agulhas com portas automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P - Röygen Blauwcom automisturadoras (30)

Nabestelling van accessoires: X-81270P